

## 9. DENEME - ÇÖZÜMLER

1. İthal edilen ham madde çeşitliğini sınırlandırmak sanayinin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Ham maddesi ülke içinden sağlanamayan sanayi kuruluşlarının ham maddesini başka ülkelerden almak sanayileşmeyi ve gelirleri artırır.

**CEVAP: C**

2. Pamukkale'de (Denizli) bulunan travertenler doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Diğer seçeneklerde deniz turizmi ya da tarihi turizm değerleri önemlidir.

**CEVAP: C**

3. Verilenler arasında yer şekillerinin en sade olduğu merkez II numara ile belirtilen İç Anadolu'dur. Bu nedenle gerçek ve izdüşüm uzaklığı arasındaki farkın en az olduğu yer II numaralı alandır.

**CEVAP: B**

4. Doğu Anadolu'nun İç Anadolu'dan daha soğuk olması yükseltiyle ilgilidir. Aynı durum Ege ve İç Anadolu Bölgeleri için de geçerlidir.

**CEVAP: E**

5. Yaz aylarında Türkiye 30° Dinamik Yüksek Basınç alanının etkisine girer. Bu nedenle Karadeniz kıyı kesimli Yıldız Dağları ve Erzurum-Kars hariç tüm yörelerde yaz kurak geçer.

**CEVAP: A**

6. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun toplam yüz ölçüme bölünmesiyle elde edilir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu ise toplam nüfusun toplam tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilir. Bu iki yoğunluk kavramı arasındaki farkın fazla olması Türkiye'nin engebeli oluşuyla, yani tarım alanlarının az olmasıyla açıklanabilir.

**CEVAP: E**

7. Verilenler içerisinde yer şekillerinin en sade olduğu merkez IV numara ile belirtilen Konya çevresidir. Bu alanda tarım alanları fazla olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.

**CEVAP: D**

8. Meke Tuzlası volkanizmaya bağlı Maar, Nemrut gölü ise krater gölüdür. Akşehir, Ulubat ve Tuzgöllerini tektonik kökenlidir.

**CEVAP: D**

9. I. Gemlik  
II. Saroz  
IV. Gökova  
V. Antalya Körfezi'dir. III numara ile gösterilen Körfez ise Erdek değil Kuşadası'dır. (Erdek, Marmara Denizi'nde yer alır.)

**CEVAP: C**

10. Hem İç Anadolu hem de G.Doğu Anadolu'da nüfus bölgelerinin kenar kesimlerinde toplanmıştır. Bunun nedeni bu alanlarda yağışın ve su kaynaklarının fazla oluşudur.

**CEVAP: C**

11. Ege Bölgesi Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Bu alanda en fazla yağış kışın düşer. Kar ve don olaylarının azlığı nedeniyle Gediz nehri kış mevsiminde daha fazla su taşır.

**CEVAP: A**

12. İstanbul ve Sinop'un enlem değerleri birbirine yakın olduğu için aralarındaki gece-gündüz süre farkı çok azdır. İstanbul ve Sinop arasında alacakaranlık süreleri arasındaki fark çok az iken Bursa ve Antalya arasındaki fark fazladır.

Hatay - İzmir arasında daha fazla boylam bulunduğu için bu ikisi arasındaki yerel saat farkı İzmir ve Bursa'ya göre daha fazladır.

**CEVAP: C**

## 9. DENEME - ÇÖZÜMLER

13. 1. merkez: Karabük → Demir - Çelik  
2. merkez: Seydişehir → Alüminyum işletmeleri  
3. merkez: Batman → Petrol rafinerisidir.

**CEVAP: C**

14. I. Ergene → Ayçiçeği  
II. Aydın → İncir  
III. Ş. Urfa → Pamuk  
IV. Giresun → Fındık

**CEVAP: D**

15. Grafiğe bakılarak:

- Kış yağışlarının kar şeklinde olduğu bilgisine ulaşılabilir. Çünkü akarsu kış aylarında çok az su taşımıştır.
- İlbaharda debisinin yükselmesine bakılarak kar erimeleriyle beslendiği bilgisine de ulaşılabilir.

**CEVAP: A**

16. Tablo incelendiğinde toplam tarım arazisi arasındaki farkın en az olduğu bölgelerin Doğu Anadolu ve Marmara bölgeleri olduğu görülecektir.

**CEVAP: E**

17. Türkiye arazisi bugünkü şeklini daha çok III. jeolojik zamanda kazanmıştır. Bu nedenle kırıklı yapı geniş yer kaplar. Kırıklı arazinin olduğu alanlar ile taş kömürü yatakları arasında bir paralellik yoktur.

**CEVAP: E**

18. Güneşlenme yer şekilleriyle değil, yörenin iklim şartlarıyla ilgilidir. Bu nedenle G.Doğu Anadolu'da yer şekillerinin sade olması güneşli gün sayısına etki etmemiştir.

**CEVAP: D**