

1. İklimsel değişimlerin jeolojik yapı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Fakat iklimde meydana gelecek değişimler bitki örtüsü, hayvancılık ve erozyon olayları üzerinde etkili olabilmektedir.

**CEVAP: B**

2. Türkiye bir Kuzey Yarım Küre ülkesidir. Bu nedenle Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylar durumundadır.

**CEVAP: B**

3. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde Kuzey Anadolu dağların kıyıya yakın ve paralel olarak uzanması, deniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin yamaç boyunca yükselmesine neden olmaktadır. Yükselen hava kütlelerinin soğuması ve yağış bırakması yani yamaç yağışları en fazla bu alanda görülmektedir.

**CEVAP: A**

4. Grafikteki sıcaklık ve yağış verilerine bakılarak yörenin ortalama yükseltisi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamaz.

**CEVAP: C**

5. Güney Doğu Anadolu Bölgesinin karasal, Akdeniz Bölgesinin ise denizel özelliğe sahip olması hem yaz hem de kış sıcaklık ortalamalarının farklı olmasına neden olmuştur.

**CEVAP: B**

6. Haritadaki veriler dikkatlice incelendiğinde tüm kıyı kesimindeki güneşlenme süresinin iç bölgelerden daha fazla olmadığı görülecektir. Örneğin Doğu Karadeniz kıyılarının güneşlenme süresi İç Anadolu'dan ve Güney Doğu Anadolu'dan daha düşüktür. Güneşlenme süreleri bulutluluk oranı ve yağış rejiminden etkilenir.

**CEVAP: C**



7. Tablodaki bilgilerden yola çıkılarak D seçeneğinde belirtilen yargıya ulaşılamaz. İzmir ile Malatya yaklaşık olarak aynı enlemde yer almalarına karşın İzmir'deki yaz süresi Malatya' dan daha uzundur.

**CEVAP: D**

8. Doğu Karadeniz'in her mevsim yağışla olması ormanların hemen kıyıdan itibaren başlamasını sağlamıştır. Yükseklerle çikıldıkça sıcaklık değerlerinin azalmasına bağlı olarak da bitki örtüsünde bir katmanlaşma görülmektedir.

**CEVAP: A**

9. İç Bölgelerde yağışın azlığına bağlı olarak A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen durumlar ortaya çıkmıştır. Fakat endüstri kuruluşlarının coğrafi dağılışıyla yağış miktarının az olması arasında çok sıkı bir ilişki yoktur.

**CEVAP: D**

10. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki kış sıcaklık ortalamaları İç Anadolu Bölgesine göre daha yüksektir. Yine Güney Doğu Anadolu Bölgesi en fazla yağışı kışın alır iken İç Anadolu Bölgesi ilkbaharda almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde zeytin ağaçlarına rastlanması b.ölgede Akdeniz İkliminin görüldüğünün en önemli kanıtıdır.

**CEVAP: C**

11. Ormanların dağılışında nemlilik çok önemli bir unsurdur. Yağışın az kuraklığın fazla olduğu iç bölgelerdeki ormanların oranı yaklaşık %21'dir. Bu nedenle "kıyı bölgelerin orman alanı oranı %75'ten fazladır" yargısı doğru olarak verilmiştir.

**CEVAP: E**

12. Seracılık faaliyetlerinin yaz sıcaklığı veya kuraklığı ile değil, kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasıyla ilgisi bulunmaktadır. Diğer yargıların oluşum nedeni ise yazların sıcak ve kurak geçmesidir. Seracılık Akdeniz bölgesinde daha çok kış mevsiminde yapılan bir faaliyettir.

**CEVAP: C**



13. Antalya'da denize girilirken Toros Dağların-  
da kayak yapılabilmesi ve aynı enlemde yer  
almalarına karşın Erzurum'un Ankara'dan  
daha soğuk olması yükseltinin sıcaklık da-  
ğılışına olan etkisine güzel örneklerdir.

**CEVAP: D**

14. Daha güneyde yer alan İç Anadolu'nun Ka-  
radeniz Bölgesinden daha soğuk olması  
enlem-sıcaklık ilişkisiyle çelişir. Bu durum  
denizellik-karasallık etkisiyle yani özel ko-  
num şartlarıyla açıklanır.

**CEVAP: C**

15. Bazı özellikleri verilen rüzgar ülkemizde  
Güneydoğudan esen Samyeli (Kesişleme)  
rüzgarıdır.

**CEVAP: B**

16. Ege Bölgesinde dağlar denize dik olarak  
uzanır. Bu nedenle denizel iklimin etki ala-  
nı da çok geniştir. Kıyı Ege Bölümünde  
yer alan Gediz Ovasında rüzgar daha çok  
batı-doğu yönünde esmektedir.

**CEVAP: B**

17. Karadeniz Bölgesinin her mevsim bol ya-  
ğışlı olması toprakta aşırı yıkanmaya bu  
durum ise toprakta kireç ve tuz miktarının  
çok az olmasına neden olmuştur.

**CEVAP: C**

18. Dağların ülkemizde genel olarak batı-doğu  
yönünde uzanması denizel iklimin etki ala-  
nını çok fazla daraltmıştır. Bu nedenle uç  
tarafı denizlerle çevrili olmasına karşın Tür-  
kiye' de daha çok karasal iklim koşulları ve  
bozkırlar yaygındır.

**CEVAP: B**

19. İç Anadolu Bölgesinde yer yer orman alan-  
larına rastlanması bölgenin bir zamanlar  
ormanlarla kaplı olduğunu fakat tarla açma  
yada yakacak için insanlar tarafından tah-  
rip edildiğini kanıtlar. Bölgede ormanların  
insanlar tarafından tahribiyle ortaya çıkan  
bitki örtüsüne "Entropojen bozkır" denir.

**CEVAP: B**

20. Bağıl nem sıcaklıkta ters orantılıdır. Bu ne-  
denle yaz aylarında bağıl nemin en düşük  
olduğu bölgemiz en sıcak bölge durumun-  
da olan Güney Doğu Anadolu Bölgesinde  
yağışın az, buharlaşmanın fazla olmasına  
bağılı olarak doğal bitki örtüsünü nemli tür-  
ler değil bozkırlar oluşturur.

**CEVAP: C**

