

1. merkez Kastamonu yöresi olup bu alanda yaygın bir şekilde kenevir üretilir.
2. merkez Edremit-Ayvalık çevresidir ve bu alan Türkiye'de en fazla zeytin üreten sahadır.
3. merkez Anamur çevresidir. Bu alan ise Türkiye'de en fazla muz üreten sahadır.

CEVAP: D

2. Mısır ve soya fasülyesi gibi ürünler özellikle yetişme döneminde yağışa ihtiyaç duyar. Bu yönüyle Karadeniz Bölgesi doğal yetişme alanıdır. Fakat sulama şartlarının geliştiği Akdeniz Bölgesi her iki ürünün de en çok yetiştirildiği alan olmuştur.

CEVAP: C

3. I → Erzurum-Kars → Büyükbaş hayvancılık
II → Bursa Çevresi → İpek böcekçiliği
III → Konya Yöresi → Koyun

CEVAP: D

4. Pamuk yazların sıcak ve kurak olduğu alanlarda yetiştirilir. Karadeniz Bölgesinde pamuk tarımının yapılmamasının nedeni güneşli gün sayısının az, kurak dönemin olmamasıdır.

CEVAP: A

5. III numara ile belirtilen Konya Tuz Gölü çevresinde yağışın az, buharlaşmanın fazla, sulama şartlarının yetersiz olması nedeniyle tarımda nadas uygulaması çok yaygındır.

CEVAP: C

6. Türkiye'de yalnızca Erzurum-Kars Bölümünde hayvancılık gelirleri tarımsal gelirin önüne geçmiştir.

CEVAP: A



7. Karadeniz kıyılarıyla, Marmara Bölgesinin kuzeyinde yaygın bir şekilde fındık tarımı yapılır. Afyon çevresi ise Türkiye'de en fazla haşhaş üreten sahadır.

CEVAP: A

8. Verilen merkezler içerisinde yağış miktarı en az olanı etrafı dağlarla çevrili olan Iğdır'dır. Dolayısıyla bazı özellikleri verilen bu tarım ürünü Iğdır'da yetiştirilemez.

CEVAP: A

9. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminin yaz aylarında yağış alması, yaz kuraklığına ihtiyaç duyan tahılların yetişmesi için uygun değildir.

CEVAP: B

10. Yaz sıcaklık değerlerinin yüksek, sulama şartlarının geliştiği alanlarda sebze tarımı da gelişir. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri yaz sıcaklık ortalamalarının düşük olması nedeniyle sebze tarımına en elverişsiz bölgemizdir.

CEVAP: E

11. Verilen alanlar içerisinde yer şekillerinin en çeşitli yayla sayısı en fazla olanı Rize'dir. Yörede orman ve çiçek çeşitliliğinin fazla olması arıcılık faaliyetleri için uygun şartlar oluşmasını sağlamıştır.

CEVAP: C

12. ★ sembolü belirtilen alan Güney Marmara'dır. Bu alan ipek böcekçiliğinin de en çok geliştiği alanlardandır. ● sembolüyle gösterilen alan Erzurum-Kars Yöresidir. Bu yörede yaz yağışlarıyla oluşan çayırlardan dolayı sığır yetiştiriciliği çok gelişmiştir.

CEVAP: E



13. Haritada zeytinin yetiştirildiği ve Akdeniz ikliminin yayıldığı alanlar gösterilmiştir. Haritadan hangi bölgede daha yaygın ve yoğun yetiştirildiğine dair bir bilgiye ulaşılamaz.

CEVAP: B

14. Muz yüksek kış sıcaklığına ihtiyaç duyan bir tarım ürünü olduğu için sadece güney kıyılarımızda yetiştirilir. Üzüm ise çok düşük kış sıcaklıklarına dayanıklı olduğu için tüm bölgelerimizde kolaylıkla yetiştirilen bir tarım ürünüdür.

CEVAP: D

15. Türkiye'deki hayvan varlığının yarısından fazlasının koyunlara ait olmasının temel nedeni bozkırların geniş alan kaplamasıdır.

CEVAP: A

16. Taralı alanlar içerisinde engebenin en fazla olduğu alan I numara ile belirtilen Doğu Karadeniz'dir. Yörede engebenin fazla olması tarımda makine kullanımı çok güçleştirmiştir.

CEVAP: A

17. Grafikte yalnızca bazı tarım ürünlerinin yıllık üretim miktarı verilmiştir. Bu nedenle hangi yıl veya hangi tarım ürününden birim alandan daha fazla verim sağlandığına dair bir bilgiye ulaşılamaz. Çünkü ürünlerin toplam ekim alanı verilmemiştir.

CEVAP: C

18. Yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu alanlarda kuraklık ortaya çıkar. Verilen alanlar içerisinde yağışın en az, buharlaşmanın en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu'da yer alan Ceylanpınar (Ş. urfa)'dır.

CEVAP: B

19. Şeker pancarı hasat edildikten sonra hemen işlenmek zorunda olan bir tarım ürünüdür. Bu nedenle pancar tarımı yapılan alanlar ile bunu işleyen fabrikalar birbirine yakın olmak zorundadır.

CEVAP: E

20. A) Isparta Yöresi → Gül
B) Kastamonu Yöresi → Kenevir
C) Malatya Yöresi → Kayısı

CEVAP: C

