

1. Çukurova, Silifke, Bafra ve Çarşamba ovaları akarsuyun deniz içerisinde alüvyonları biriktirmesi sonucu oluşmuş delta ovalarıdır. Amik Ovası ise tektonik oluşumlu bir ovadır.

CEVAP: E

2. Yağışın, eğimin ve killi toprağın yaygın olduğu alanlarda heyelan olayları fazladır. Heyelan sonucu akarsu vadilerin önünün kapanmasıyla heyelan set gölleri oluşur. Tortum, Sera, Abant, Yedigöller gibi göller bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde heyelan olayları en fazla Karadeniz Bölgesinde görülür.

CEVAP: B

3. Türkiye’de dağların güney yamacının kuzey yamaca göre daha sıcak olması engebeli bir ülke olmasıyla değil, Kuzey Yarım Küre’de bakı etkisinden kaynaklı bir durumdur.

CEVAP: C

4. Yağışın az, bitki örtüsünün cılız olduğu İç Anadolu (IV) ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde (V) erozyon olayları çok fazladır.

CEVAP: E

5. İzdüşüm alan herhangi bir yerin eğim durumu hesaba katılmadan, kuşbakışı görünüşe göre esas alınarak bulunan alandır. Gerçek alanda ise eğim ve yükselti hesaba katılır. Türkiye’de gerçek ve izdüşüm alan arasındaki farkın çok fazla olması engebeli bir ülke olmasından kaynaklanır.

CEVAP: A

6. Türkiye’de heyelan olaylarının daha çok ilkbaharda yaşanmasının nedeni bu dönemde kar erimelerin artmaya başlamasındandır. Kar erimeleriyle beraber toprak suya doymun hale gelerek heyelan olayının gerçekleşmesine etki eder.

CEVAP: E

7. Türkiye’de yer şekillerinin ulaşım, kıyı tipleri, kıta sahanlığı ve akarsu havzaları üzerinde önemli etkisi vardır. Fakat ülkemizde dağların güney yamacındaki ürünleri, kuzey yamaca göre erken olgunlaşmasında yer şekillerinin değil bakı etkisinin rolü vardır.

CEVAP: C



8. Karadeniz Bölgesinde yer alan dağlar denize yakın ve paralel olarak uzanır. Bu durum tarım alanları, yerleşme, yağış miktarı ve ulaşım üzerinde önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Fakat bölgenin her mevsim yağışlı olmasıyla dağların uzanış yönünde her hangi bir bağlantı yoktur.

CEVAP: E

9. Toprağın verimli olan üst kısmının akarsu ve rüzgar tarafından aşındırılarak taşınmasına erozyon denir. Aşırı otlatmanın engellenmesi ve ağaçlandırma çalışmaları erozyonu önleyici bazı önlemlerdir. Fakat toprağın eğime paralel sürülmesi ve nadas uygulamasının artırılması erozyonu önlemez aksine artırır.

CEVAP: C

10. Grafiğe bakılarak A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen yargılara ulaşılabılır. Fakat akım grafiğine bakılarak akarsuyun taşkın yapıp yapmadığına dair bir bilgiye ulaşılamaz. Çünkü akarsuyun içinde aktığı yatağın eğim özellikleri verilmemiştir.

CEVAP: E

11. Türkiye arazisi bugünkü şeklini daha çok III. jeolojik zamanda kazanmıştır. Genç bir ülke olduğumuz için yer kabuğunu oluşturan faylar henüz yerine oturmamıştır.

CEVAP: E

12. Büyük Çekmece gölü dalganın taşıdığı kumların bir koyun önünü kapatması sonucu oluşmuş olan kıyı set gölüdür. Bu nedenle yükselti ortalaması en az olan göldür.

CEVAP: C

13. Haymana İç Anadolu Bölgesinde yer alır ve ilkbahar yağışlarından dolayı tahıl tarımı yapılır (I). Yaz yağışlarından dolayı çayır bitki örtüsüne sahip olan Ardahan Platosunda büyükbaş hayvancılık çok gelişmiştir (II). Akdeniz Bölgesinde yer alan Taşeli Platosunda kireç taşının yaygınlığına bağlı olarak nüfuslanma da çok azdır (III).

CEVAP: C



14. Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde dağların denize göre konumu yağış rejimini değil yağış miktarını belirlemiştir.

CEVAP: A

15. A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen yarğaların ortaya çıkmasında yer şekillerinin 1. dereceden rolü vardır. Fakat Akdeniz Bölgesinde turizm süresinin uzun olmasında yer şekillerinin değil mutlak konumun rolü vardır.

CEVAP: C

16. İç Anadolu Bölgesinde özellikle Konya Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yeridir. Yörede yağışın az buharlaşmanın fazla olmasına bağlı olarak Tuz Gölünün alanı çok önemli ölçüde küçülür.

CEVAP: D

17. Verilen alanlar içerisinde ortalama yükseltisi en az olanı Kıyı Ege' de yer alan I. merkezdir. Bu nedenle bu alanda buzul aşınım ve birikim şekillerine rastlanmaz. Diğer merkezlerin ise ortalama yükseltileri fazla olduğu için buzullaşmanın etkilerine rastlanır.

CEVAP: A

18. Marmara Gölü → Kıyı Ege' de
Tuz Gölü → Konya Bölümünde
Van ve Hazar Gölleri → Yukarı Murat – Van Bölümünde yer alır. Doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti artar. Bu nedenle göllerin deniz seviyesinde olan yükseltileri de artar.

CEVAP: D

19. Batı Karadeniz' de dağlar denize paralel, Kıyı Ege' de ise dik uzanır. Bu nedenle her iki bölümde farklı kıyı tipleri oluşmuştur.

CEVAP: B

20. Köyceğiz → Alüvyon set
Abant → Heyelan set
Van → Karma

B. Çekmece → Kıyı set özelliğine sahiptir.

CEVAP: B

