

1. Verilen yerler içerisinde yer şekillerinin en sade olduğu yer Orta Karadeniz'dir. Bu nedenle makineleşme düzeyi de en fazla olanı Orta Karadeniz'dir.

**CEVAP: B**

2. Türkiye'de depremler de can ve mal kaybının fazla olmasında kullanılan malzemenin çok büyük bir etkisi vardır. Deprem alanlarında hafif ve esnek malzemenin kullanılması can ve mal kayıplarını önemli ölçüde azaltacaktır.

**CEVAP: C**

3. Delta ovası oluşturan, menderes yaparak taban seviyesi ovası içinde akan bir akarsuyun rejimi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamaz. Akarsuyun rejimi, yağış rejimi, yağış miktarı beslenme kaynakları gibi faktörlere bağlıdır. Diğer seçeneklerde belirtilen yargılara ise ulaşılabilir.

**CEVAP: B**

4. Göl sularının acı, tatlı veya sodalı özelliğe sahip olmasında sularını bir ayak vasıtasıyla dışarı gönderip göndermemesi yani açık veya kapalı havza özelliğine sahip olması belirleyicidir. Beyşehir'in yer altından, Eğirdir'in ise yer üstünden bir gideğeni olduğu için suları tatlıdır. (Van, Tuz ve Acı Gölün ise gideğeni olmadığı için kapalı havza özelliğine sahiptirler.)

**CEVAP: D**

5. Tuz Gölü, Kura Havzası (Hazar Gölü) Konya ve Van Gölü çevresi kapalı havza özelliğine sahiptir. Fakat Ergene Çayı Ege Denizine ulaştığı için açık havza özelliğine sahiptir.

**CEVAP: C**

6. Türkiye'deki akarsularının akış hızının fazla, rejiminin düzensiz olması taşımacılıkta yararlanılmamasına neden olmuştur. Akarsularımızla ilgili olarak diğer seçeneklerde belirtilenler doğrudur.

**CEVAP: C**



7. Manyas (Kuş) Gölü tektonik hareketler sonucu oluşmuş olan çukurluğa zamanla suların dolmasıyla oluşmuştur. Yani Manyas Gölü heyelan set gölü değil tektonik kökenli bir göldür.

**CEVAP: C**

8. İç Anadolu Bölgesinde sadece denizde yaşama özelliğine sahip canlı kalıntılarına rastlanması bu alanların bir zamanlar denizlerle kaplı olduğunu, fakat zamanla kıvrım hareketleri sonucunda denizel tortul tabakaların yükseldiğini kanıtlar.

**CEVAP: B**

9. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için yer kabuğu henüz yerine oturmamıştır. Bu yüzden sık sık depremler yaşanmaktadır.

**CEVAP: E**

10. Fıratı Çoruh, Aras ve Sakarya gibi akarsular kaynağını karasal iklim bölgelerinden aldığı için akımlarında kar erimelerinin çok büyük rolü vardır. Fakat Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen Asi sıcak iklim bölgesinden geldiği için akımında kar erimelerinin belirgin bir rolü yoktur.

**CEVAP: D**

11. Verilen merkezlerin tümünün ortak özelliği deprem riski en az olan yerler olmalarıdır. Bu alanlarda etkin fay hatları bulunmamaktadır.

**CEVAP: B**

12. Antalya Bölümünde yer alan Kestel Ovası kalkerli arazilerde aşınmasıyla beraber oluşmuş olan karstik (polye) bir ovadır. Çukurova delta, B. Menderes, Amik ve Adapazarı ovaları ise tektonik kökenli ovalardır.

**CEVAP: E**



13. A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen yarıklar erozyonu önlemek için alınması gereken tedbirlerdir. Fakat mera alanlarını tarım alanlarına dönüştürmek erozyonu artırıcı bir rol oynar.

**CEVAP: C**

14. Ülkemizde kireç taşının en fazla olduğu bölge Akdeniz Bölgesidir. Kireçli arazilerde tarımsal etkinlikler zorlaştığı için bu alanlar da genel olarak nüfuslanma da çok azdır. I numara ile belirtilen Taşeli Platosunda engebeli arazinin yanısıra kireç taşının da fazla oluşu nüfuslanma üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.

**CEVAP: A**

15. Manyas Gölü (Kuş) karstik değil, tektonik kökenli bir göldür.

**CEVAP: C**

16. Haliç kıyı tipi okyanus kenarlarında gelgitin etkisiyle oluşan bir kıyı tipidir. Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmaması nedeniyle haliç kıyı tipi oluşmamıştır. (İstanbul, Haliç ise Ria kıyı tipine örnektir.)

**CEVAP: D**

17. Verilen akarsu havzaları içinde sanayileşme düzeyi en az olan IV numara ile belirtilen Çoruh Havzasıdır. Bu alanda sanayileşme az olduğu için akarsuların kirlilik düzeyleri de çok azdır.

**CEVAP: D**

18. Verilen ovalar içerisinde ortalama yükseltisi en az olanı bir delta ovası durumunda olan Menemen'dir. Diğer ovalar sarı ve tonlarıyla gösterilirler. Menemen Ovası yeşil renkle ile gösterilir.

**CEVAP: B**

19. Arazide bulunan kayaç türü, yörede oluşan toprak tipi üzerinde etkilidir. Kireç taşının fazla olduğu Taşeli Platosunda terra-rosa, volkan tufünün yaygın olduğu Kapadokya Yöresinde ise tüflü topraklar oluşmuştur.

**CEVAP: A**

20. Verilen coğrafi bölümler içerisinde ortalama yükseltisi en az olanı Ergene'dir. Bu nedenle bu bölümde buzul aşınım ve birikim şekillerine rastlanması beklenemez.

**CEVAP: B**

